




Za daljnje informacije  
Vam rado stojimo na Raspolaganju.  
Srdačni pozdravi, Vaš  
Tim iz prakse:





# Grupa B-streptokoki

## Oprez novorođenčad-sepsa!

Streptokoki su okrugle bakterije. One su uzročnici raznih oboljenja, npr. upala krajnika ili šarlaha. Podgrupa streptokoka koja je važna za majke i novorođenčad je „grupa B“. Ove bakterije se prema tome zovu „grupa-B-streptokoki“ ili „GBS“. Kod deset do 40 posto svih trudnica postoji GBS na grliću maternice i vagini bez da uzrokuju poteškoće.

### Zašto su streptokoki opasne?

Otprilike jedna trećina svih odraslih ima grupu B-streptokoke – jednu od mnogih bakterija koje žive u našem tijelu ali ne uzrokuju nikakve probleme. Inficirani ne pokazuju nikakve simptome.

Novorođenčad pak još nema razvijen imunološki sustav koji bi nametljivce držao u redu. Pri porodu se streptokoki mogu prenijeti na novorođenčad. Smirujuće je to što se to statistički gledano događa u dva od pet tisuća poroda, dakle rijetko.

Ako se to ipak dogodi, kod novorođenčeta može doći do sepse koja većinom počinje visokom vrućicom i upalom pluća. U ranijem obliku ove vrste „trovanja krvi“ prvi znaci bolesti javljaju se već unutar 20 sati nakon poroda. Intenzivnom medicinskom njegom preživi većina djece – ali ipak ne sva.



Od preživjelih oko jedne trećine snose od toga kasne neurološke posljedice. Prenošenje GBS-a na novorođenče može se uspješno spriječiti tretiranjem majke antibioticima – ako pravovremeno znamo da je majka nositelj ovog uzročnika. Ova preventivna mjera pobrinula se za to da se zadnjih godina smrtnost novorođenčadi zbog GBS smanjila. No još uvijek su streptokoki grupe B najčešći uzrok teških infekcija u novorođenčadi.

### Što možete napraviti?

Stručni timovi ginekologa i pedijatarata Preporučaju takozvani „GBS-Screening“, tj. pregled svake trudnice na grupu-B-streptokoka. Najbolje vrijeme za to je – kod „normalne“ trudnoće – 35. do 37. tjedan trudnoće.

Ukoliko imate GBS, Vaša se beba može zaraziti prilikom poroda.

Rizik se povećava ako

- prerano dobijete trudove (prije 37. tjedna trudnoće)
- Vaš vodenjak sa ili bez naznaka trudova prije vremena (prije 37. tjedna trudnoće) pukne
- Za vrijeme trudova dobijete povišenu temperaturu (37,8°)

Za pregled se uzima bris iz vagine i anusa. Taj bris se u laboratoriju mikrobiološki istražuje i utvrđuje se postoje li GBS. Test je visoko osjetljiv i time i precizan. To znači, ako bris sadrži streptokoke, oni će se sigurno otkriti laboratorijskim nalazom.

### Sigurnost za Vašu bebu

Ako ste pozitivni u GBS-Screeningu, obavezno taj nalaz ponesite u rađaonicu. Stručni tim ne preporuča samo Screening nego i zaštitu antibioticima te pregled bebe odmah nakon poroda od strane pedijatrijske službe ako rezultat pretraživanja pokaže B-streptokoke. Ova kombinacija testa na GBS prije i profilaksa za vrijeme/nakon poroda već godinama spašava puno mladih života.



Mi Vam u svojoj praksi nudimo analizu brisa kao individualnu uslugu o zdravlju. Pitajte nas o troškovima i najboljem trenutku za provođenje testa. Želimo najbolje za Vašu bebu.